

Polacy coraz bardziej tolerancyjni w sprawie HIV/AIDS

*Wyniki badania dotyczącego profilaktyki zakażeń HIV/AIDS zrealizowanego przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS**

Według 80% Polaków osoby zakażone HIV lub chore na AIDS powinny mieć prawo do kontynuowania swojej pracy mimo zakażenia, a prawie połowa ankietowanych akceptuje zachowanie choroby w tajemnicy przed społecznością. Jednocześnie Polacy czują się bardzo dobrze poinformowani o drogach zakażenia HIV oraz sposobach zabezpieczania się przed zakażeniem (odpowiednio 85% i 84% badanych).

Z roku na rok wiedza na temat sposobów wykrywania zakażenia HIV/AIDS sukcesywnie rośnie. W stosunku do 2009 roku odsetek osób, które uważają siebie za dobrze poinformowanych wzrósł aż o 11 punktów procentowych, do poziomu 60%. Niestety w dalszym ciągu Polacy nie dysponują dokładną wiedzą na temat miejsc, w których można przeprowadzić test na obecność wirusa lub porozmawiać z doradcą. Jedynie 55% ankietowanych wie, gdzie należy się skierować, by uzyskać niezbędne informacje. Polacy nie wiedzą także, kiedy należy wykonać test w kierunku HIV.

Najlepszy czas na test?

Niemal połowa Polaków przekonana jest, iż test należy wykonać bezpośrednio po zdarzeniu (49%), a co piąty, że po upływie mniej niż 12 tygodni. Jedynie 4% respondentów wie dokładnie kiedy powinno się udać do punktu diagnostycznego oraz zna termin - "okienko serologiczne" - określający przedział czasu od chwili zakażenia do wytworzenia przeciwciał. Określenie to znane jest przede wszystkim uczniom (96%) oraz mieszkańcom dużych miast (90%). Co ciekawe aż 84% osób, które nigdy nie wykonały testu w kierunku HIV, również dobrze zna ten termin.

Rozmowy intymne

Polacy chętnie rozmawiają ze swoim partnerem o sprawach związanych z zagrożeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jeżeli występują opory w rozmowie, to wynikają one głównie ze strachu przed oceną partnera (13%) lub ze wstydu. I choć głównymi tematami poruszonymi są poprzednie związki (66%) oraz odpowiednie zabezpieczenie się (59%) to badani dyskutują także o zagrożeniach zakażeniem HIV (38%) oraz pytają partnera o wykonanie testu w kierunku HIV (24% ankietowanych pytało partnera a 21% spotkało się z tym pytaniem).

Zapobieganie HIV

Zdecydowana większość Polaków (88% badanych) uważa, że wierność oraz stały związek zmniejsza ryzyko zakażenia HIV. Niewielu mniej - 86% respondentów jako najbardziej skuteczną metodę

zmniejszającą ryzyko zarażenia HIV wskazuje stosowanie prezerwatywy podczas każdego stosunku seksualnego. Dodatkowo stosowanie prezerwatywy odbierane jest zazwyczaj jako dowód odpowiedzialności partnera (66%), a osoby wymagające tego od partnera traktowane są jako godne zaufania (53%).

Wykonując test w kierunku HIV Polacy udaliby się przede wszystkim do lekarza rodzinnego (37% ankietowanych) a następnie do punktu krwiodawstwa (27%) lub do przychodni lekarskiej (24%). Co piąty badany przyznaje również, że decydując się na test w pierwszej kolejności samodzielnie poszuka niezbędnych informacji w internecie lub innych źródłach (21%).

***Badanie dotyczące profilaktyki zakażeń HIV/AIDS zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS w dniach 1-8 czerwca 2011 r., metodą ankiety wypełnianej samodzielnie na próbie N: 600 osób, w wieku 18-39 lat.**